

# 滿意婦產科診所-滿意女人健康...

Title: 流產過程中反悔, 怎麼辦?

Subtitle: 性愛大方說

Author: jasonbywu

Date: 03月19日

URL: <http://www.carewoman.net/modules/article/view.article.php/c10/96>

摘要: 不在計劃之中的懷孕, 考慮再久, 是否放棄胎兒, 似乎一輩子也無法做出決定, 流產之後, 心中懊悔的人不能說沒有, 以往用手術處理, 如果已經事過境遷, 結局是無法改變的, 但現在用藥物流產的機率增加很多, 服藥的過程胎兒並不是馬上不見, 加上藥物有一定的失敗率, 若是在流產的療程中改變決定, 胎兒還未排出, 可是藥已經吃了, 該怎麼辦呢?

不在計劃之中的懷孕, 考慮再久, 是否放棄胎兒, 似乎一輩子也無法做出決定, 流產之後, 心中懊悔的人不能說沒有, 以往用手術處理, 如果已經事過境遷, 結局是無法改變的, 但現在用藥物流產的機率增加很多, 服藥的過程胎兒並不是馬上不見, 加上藥物有一定的失敗率, 若是在流產的療程中改變決定, 胎兒還未排出, 可是藥已經吃了, 該怎麼辦呢? RU486被正式使用於流產是在法國, 至今已超過15年的時間, 目前治療的方式已經相當定型, 也就是先服用RU486, 隔一到三天之後再服用前列腺素, 以增加成必v, RU486在服用之後會快速進入胎盤, 懷孕初期三個月, 胎兒對藥物的吸收比例會比懷孕中、後期高得多。只有服用RU486與已經完整服用RU486及前列腺素的情況是不同的。單獨服用RU486是否會造成問題的研究十分有限, 在報告過的一、二十例個案中, 只有一例有胎兒畸形。1989年, 25歲的孕婦在懷孕5週時, 服用了600 毫克的RU486, 之後她決定要留下這個小孩, 不過懷孕到了17週時, 發現胎兒有所謂的sympodia或者稱為尾部退化症候群 (caudal regression syndrome)的嚴重畸形, 下肢連合在一起, 只有一隻腳掌, 沒有內外生殖器或肛門, 沒有腎臟, 這種嚴重的情況我們也稱之為美人魚綜合症, 此外, 也發現有唇顎裂的現象。問題是, 美人魚綜合症一般認為是懷孕第3週時發育產生的問題, 但孕婦服藥的時間是在懷孕5週, 理論上服藥與這個重大畸形可能無關, 不過唇顎裂是在懷孕36天左右發育異常產生的問題, 與RU486就無法撇清關係了。服藥後正常的例子相對的比較多, 1991年, 法國的學者報導一位30歲的孕婦在6週服用400毫克的RU486, 最終生下了3030公克健康的小孩, 英國也報導了三例正常的個案, 之後的零星個案都沒有再發現有重大畸形的狀況。法國盧倫(Rouen)大學婦產科在2007年曾發表一例個案, 胎兒最終發現有羊膜帶症候群。羊膜帶症候群(amniotic band syndrome), 發生的機會約是1/1200, 病因還不是很清楚, 有人說是血管發育問題, 有人認為是懷孕初期時破水造成的, 更有人認為是基因遺傳的問題, 胎兒可能產生肢體缺損、變形、水腫等問題, 這個問題與藥物的關係也是很難確定的。前列腺素就與RU486不同了, 在釵h研究中都顯示對胚胎有明顯的壞處, 可能造成的畸形包括腦神經缺損(Meliaus#39; syndrome), 肢體異常, 2006年英國Chester醫院也發表了使用這個藥物, 造成胎兒單側小腦萎縮的病例。總結來說, 服用RU486之後, 沒有再接著服用前列腺素, 目前看來似乎胎兒出現問題的機率並不是很高, 不過它畢竟不是安全的藥物, 目前在藥物的分級上, 也分類在X級, 若真的很想保留胎兒, 也了解潛在的風險, 可在與醫生充份溝通的狀況下, 考慮保留與否。相對的, 如果已服用前列腺素, 就不應該考慮保留胎兒。除了藥物之外, 流產手術之後, 胚胎沒有被清除掉, 還繼續長大的情況也並非完全不可能, 它發生的機率大約是0.023到1%, 週數愈小, 因為胚囊比較小, 愈有可能沒清乾淨, 與醫生手術的技巧、胚囊的位置、多胞胎、手術後有沒有做超音波確認都有關係, 若是選擇保留胎兒, 一些文獻報導可能造成肢體以及口腔、顏面異常, 這樣的例子非常少, 若真的要保留胎兒, 發育上的風險其實蠻高的。如果你在流產過程中決定保留胎兒, 記得要快點找醫生討論, 並且請醫生開安胎藥服用或是打安胎針, 多臥床休息, 密切追蹤胎兒的發育狀況, 若胎兒能發育到10週以上, 流掉的機率就很低了, 在產檢的過程中, 可考慮做高層次超音波, 確定胎兒沒有外表或器官上發育的問題, 希望上述的資料, 能對妳有所幫助。